

CALENDÁRIO VACINAL SBIIm 2022/2023

Do nascimento à terceira idade



VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																		ADOLESCENTE			ADULTO		IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS				
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIEs*				
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente														Vacinar pessoas contactantes de hanseníase					SIM	SIM	NÃO						
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento								Vacinar os não vacinados anteriormente																		SIM	SIM	SIM
Rotavírus	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.			CONTRAINDICADA																					SIM	SIM	NÃO		
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)										SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa		
Haemophilus influenzae b	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco										SIM, três primeiras doses	SIM	SIM		
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO		Vacinar pessoas em situações especiais de risco										SIM, três primeiras doses	SIM	SIM		
Pneumocóccas conjugadas	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10 ou VPC13), iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	VPC10 ou VPC13 – Vacinar os não vacinados anteriormente		VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco					VPC13: uma dose			SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10 e VPC13				
Meningocóccas conjugadas	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO		Reforço aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de cinco anos			Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 a 12 anos	SIM	SIM, menC e menACWY				
Meningocócica B	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente – Duas ou três doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada										Vacinar pessoas em situações especiais de risco			NÃO	SIM	NÃO	
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																					SIM	NÃO	NÃO					
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL																					SIM, Trivalente menores de 5 anos e maiores de 60 anos	SIM, Tri ou Tetravalente e HD4V (60 anos ou +)	SIM, Trivalente					
Febre amarela	Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. Nas demais faixas etárias: dose única. Como não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina, de acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose em outras idades pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal																					SIM	SIM	NÃO					
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente										Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, até 59 anos	SIM	NÃO		
Varicela (catapora)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente										Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM	SIM	SIM		
Hepatite A	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente										Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM		
HPV												Duas doses para meninas e meninos		Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses.					Vacinar não vacinados e pessoas em situações especiais de risco, a critério médico (três doses)					SIM, HPV4 duas doses para meninas e meninos de 9 a 14 anos.	SIM, HPV4 e HPV9	SIM, HPV4 três doses para homens e mulheres até 45 anos pertencentes a grupos especiais			
Pneumocócica 23 valente												Vacinar pessoas em situações especiais de risco										Duas doses com intervalo de cinco anos			NÃO	SIM	SIM		
Herpes zóster												A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco					Rotina a partir dos 50 anos					NÃO	SIM	NÃO					
Dengue	CONTRAINDICADA														Recomendada para pessoas soropositivas para dengue, de 6 a 45 anos: três doses: 0 – 6 – 12 meses				CONTRAINDICADA					NÃO	SIM	NÃO			
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19																												

18/04/2023 • Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBIIm 2021/2022* e nos *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.

* Consultar manual do CRIE em https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_centros_imunobiologicos_especiais_5ed.pdf (acesso em 01.09.2022). Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.



Manual do CRIE



Calendários de vacinação SBIIm